N° 34

Observation de Chirurgie, au Sujet de l'Emputation de la Cuisse occasionnée par une Exostose et une Carrie de trente années, avec plusieurs remarques tres Curieuses: Communiquée par Bourrier cy devant Chirurgien Major du Regiment de Nice, et de present de l'hopital Royal de Marsal ce 19.e Xbre 1735.

Cette Exostose s'est Communiquée depuis l'extremité inferieure du tibia jusqu'à sa partie superieure, Le Perounée s'en trouve égallement éxostosié dans toute son étendüe, ce qui luy a occasionné deux adherences avec le tibia, dont l'une commence depuis sa partie inferieure jusqu'à la moyenne, et l'autre a sa partie moyenne superieure, vis avis l'eminence du tibia; Ces adherances se trouvent formées par plusieurs végétations qui partent tant de l'un que de l'autre os, produites par le vice de leurs sucs nouriciers. Le tibia se trouve non seulement exostosié dans toutes ses parties, mais encore carrié depuis sa partie moyenne inferieure interne, jusque dans le Corps de son Epiphise superieure. Dans

ARC 61
n° 62
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

toute cette étendüe, l'os se trouve perforé en plus de vingt endroits, par ou la matière des abcés qui se sont formés dans la moëlle s'est évacuée; Ce qui a produit dans l'os des vlceres Calleux, dures, noüeux avec des bords renversés, et tels quils se rencontrent quelquefois dans les Chaires. Le plus Considerable de ces vlceres se trouve scitué a la partie moyenne superieure de l'os, jusque dans le propre Corps de son Epiphise; ce qui forme vn vlcere d'vne étendue surprenante, ayant six grands travers de Doits de longueure, quatre de largeure, et autant de profondeur, ne restant a l'os qu'vn tiers de son écorce pour ainsi dire partie posterieure, Ce qui a fait que le malade s'est cassé la Jambe en marchant a son Ordinaire avec des Bequilles; et Cela, dans vn Chemin le plus plat et le mieux ûni: Ce que je luy avois prédit, il y a même plus de quatre Années. Nottez que dans la fracture, les tranchants de l'os avoient Ouverts l'Arterre Tibial, Laquelle donna du sang considerablement; Mais heureusement pour le malade, que sa jambe étoit toujours envelopée de

quantité de Compresses, et pardessus, d'une bande par
plusieurs circonvolutions reiterées; malgré cette precaution
imprevüe a cet égard, Le Malade n'a pas laissé que de
perdre au moins trois Chopines de sang sur la place,
et sans cette precaution favorable par hazard dans cet
accident, Le malade y seroit mort avant qu'on eut pû être
a portée de lui donner du secours; et cela d'autant plus
que l'accident lui est arrivé a plus d'une demie lieüe
de sa demeure, se trouvant seul. Ce ne fut qu'a ses
plaintes et a ses cris que quelqu'un le joignit: L'on
vint me chercher tout aussitost, je party sur le Champs
pour m'y transporter, je trouvay le malade baignant
dans son sang; malgré cela avec bon Courage. Je
m'étois douté de cet accident, même avant que de le
voir, sur le récit que l'on m'en avoit fait. Aussi
m'étois-je precautionné d'eguilles courbes, et de ruban
de fil ciré pour faire la Ligature sur le Champs en
Cas de besoin; Mais je fut bien surpris, et satisfait
en même tems, lors que je m'aperçû que le sang ne
donnoit plus, en faveur d'une grande quantité de
Cailleaux de sangs qui remplissoient éxactement le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Bandage et le bas du malade; formant un point d'apuy a l'artere, de façon quelle ne fournissoit plus. Sans autre examen, je le fit charger (tout le plus doucement quil fut possible dans un Banneau garny de paille, accompagné d'une personne pour luy maintenir la jambe) et conduire chez luy, ou je me rendis aussitost; Je le fis mettre sur son lit, Couper sa Culotte et son bas: Ensuitte, je remarquay aisement que le sang n'avoit point donné dans la Voiture. Alors je ne m'attachay uniquement qu'a seconder l'effet du premier Bandage par un second dessus le premier, Ce qui me donna le tems (non seulement de preparer l'apareil) mais encore de faire Confesser le malade, et de lui faire recevoir ses Sacremens. L'operation ne fut faite que le Landemain (car c'etoit sur le soir que l'accident lui arriva.) Il passa fort bien la Nuit et sans accidens; Je luy fit l'operation selon la methode du Livre de Monsieur Garengeot, que je trouve trés avantageuse, neanmoins l'operation n'a pas duré tout au plus quatre a Cinq minuttes: il ne s'y est trouvé que deux trones d'artere, quoy quil y en ait ordinairement trois[+], Lesquels se sont rencontré s'y

[+] et même quelq. fois quatre,

voisins, que je n'en ai fait qu'une Seule Ligature,
(Chose trés rare, Je n'ai levé le premier apareil
que trois fois vingt quatre heures aprés l'Operation).
Le Sang n'a donné en aucune façon quoy que je ne me
Sois Servi d'aucuns astringens; pas même des Boutons
de Vitriol: aussi ai je remarqué que le malade n'a
presque point eû de ces tressaillemens considerables, et
Si a craindre pour les Ligatures, Lesquels vraisemblablem[t].
Se trouvent Occasionnés par les irritations Corrosifs de ces
astringents. Ce qui m'a le plus Surpris, et que je n'ai
jamais vüe arriver, C'est que la ligature y Seroit encore,
tant les arteres resistoient au fil, et le fil aux Arteres,
Si je n'avois pris le party de la Couper le plus finement
qu'il m'a été possible Sept Semaines entieres aprés
l'Operation, étant pour lors un corps étrange, et par-
consequent nuisible a la Cicatrisation de la playe, qui
auroit été totallement terminée au bout des deux mois
de l'operation, quoique dans un mauvais sujet âgé
d'environ 55. ans, Scrophuleux dés Sa naissance, et
depuis trente ans, Carrie a la jambe avec écoulement
habituel et considerable. Il Se porte actuellement

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

mieux que jamais il n'a fait, ne souffrant en aucune façon. Cette grande maladie á commencé d'abord, et selon le rapport du malade par vne espece d'Engelure au tallon et a la cheville du pied; Quelque tems aprés, le malade se trouva attaqué d'vne douleur dans l'Epaule, qui luy dessendit ensuitte dans le coté droit de La poitrine, Ce qui l'étouffoit; et dés le lendemain, Cela luy tomba dans la jambe droite, Laquelle devint grosse comme vn Enfant, fort enflamée, avec de violentes douleurs qui le faisoient crier nuit et jour sans relâche; Ce qui dura pendant quinze jours: Au bout duquel tems, le depost se fit jour de lui même. Le Malade m'a assurré quil en sortit quatre pots de matiere corrompüe, Que dans la quinzaine suivante, on lui tira de la jambe plus de vingt petits os; Depuis ce tems lá le malade en a tiré de tems á autre, et sa jambe a toujours rendû, l'un comportant l'autre, au moins deux grands verres de matiére par jour. Ce qui m'a engagé a luy apliquer vn Cotaire au bras, afin de faire revultion, et de ne pas suprimer tout d'vn coup a la nature vn tel écoulement. Cette

maladie m'a parû si étendüe dans ce genre, quil n'est pas possible de croire quil puisse en arriver une plus considerable dans la Nature. Cequi m'a engagé a en communiquer l'Observation a l'Accademie, Comm'aussi pour luy donner des preuves de la certitude de la Chirurgie, et de sa ressource dans cete Operations, même dans les cas les plus desesperés. Cecy en est une grande preuve, puisque la Chirurgie elle même n'auroit pas dû esperer une guerison aussi prompte et aussi parfaite, surtout dans un Sujet si mauvais, et attaqué d'une maladie si étendüe, aussi inveterée, et avec un écoulement semblable. Monsieur Petit dit dans son traité des Maladies des os, que rarement le femur, l'humerus, Le tibia, le Peronnée, le Radius, le Cubitus, Les Costes, les os des hanches &c, sont attaqués d'exostoses dans toute leur étendüe; Cependant, cela se rencontre icy au Tibia et au Peronné dans toute leur longueur, et j'en donneray la preuve. /.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE